膵癌レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
GS	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8	点滴静注	30分	
GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/㎡	day1、8, 15	点滴静注	30分	
FOLFIRINOX	イリノテカン	180mg/㎡	day1	点滴静注	90分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
mFOLFIRINOX	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FL+nal-IRI	イリノテカン(リポソーム製剤)	70mg/㎡	day1	点滴静注	90分	14日間
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	